

2

کثیررکنیاں (POLYNOMIALS)

2.1 تعارف

نویں کلاس میں آپ نے ایک متغیر والی کثیررکنیوں اور ان کے درجہ کے بارے میں پڑھا تھا، یاد کیجئے اگر $p(x)$ میں کوئی کثیررکنی ہے تو $p(x)$ کی سب سے بڑی قوت کثیررکنی $p(x)$ کا درجہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر $4x + 2$ متغیر x میں ایک کثیررکنی ہے جس کا درجہ 1 ہے۔ $2v^2 - 3v + 4$ متغیر v میں ایک کثیررکنی ہے جس کا درجہ 2 ہے $2, 5x^3 - 4x^2 + x - \sqrt{2}$ متغیر x میں ایک کثیررکنی ہے جس کا درجہ 3 ہے اور $7u^6 - \frac{3}{2} + 4u^2 + u - 8$ متغیر u میں ایک کثیررکنی ہے جس کا درجہ 6 ہے۔ عبارتیں جیسے $\frac{1}{x-1}$ ، $\sqrt{x} + 2$ ، $\frac{1}{x^2 + 2x + 3}$ وغیرہ کثیررکنیاں نہیں ہیں۔

درجہ 1 کی کثیررکنی خطی کثیررکنی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر $2x - 3$ ، $\sqrt{3}x + 5$ ، $y + \sqrt{2}$ ، $\frac{2}{11}x + 4$ ، $3z + 4$ وغیرہ تمام خطی کثیررکنیاں ہیں، کثیررکنیاں جیسے $x^3 + 1$ ، $2x + 5 - x^2$ وغیرہ خطی کثیررکنیاں نہیں ہیں۔

ایک کثیررکنی جس کا درجہ 2 ہوتا ہے دو درجی کثیررکنی کہلاتی ہے لفظ quadratic (دو درجی) "quadratic" سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب 'مربع' ہے۔ $2x^2 + 3x - \frac{2}{5}$ ، $y^2 - 2, 2 - x^2 - \sqrt{3}x$ ، $\frac{u}{3} - 2u^2 + 5$ ، $\sqrt{5}v^2 - \frac{2}{3}v, 4z^2 + \frac{1}{7}$ ۔

دو درجی کثیررکنیوں کی کچھ مثالیں ہیں (جن کے ضریب حقیقی اعداد ہیں) مجموعی طور پر n میں کوئی بھی دو درجی کثیررکنی $ax^2 + bx + c$ شکل کی ہوتی ہے، جہاں a, b, c حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ، ایک کثیررکنی جس کا درجہ 3 ہوتا ہے کعبی کثیررکنی کہلاتی ہے۔ کعبی کثیررکنی کی کچھ مثالیں ہیں۔ $2 - x^3, x^3, \sqrt{2}x^3, 3 - x^3, +x^3, 3x^3 - 2x^2 + x - 1$ ۔ حقیقت کعبی کثیررکنی کی عمومی شکل ہے۔

$$ax^3 - bx^2 + cx + d$$

جہاں a, b, c, d حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$

آئیے اب کثیررکنی $p(x) = x^3 - 3x - 4$ پر غور کرتے ہیں۔ اس کثیررکنی میں $x = 2$ رکھتے ہیں اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے $p(2) = 2^3 - 3 \times 2 - 4 = -6$ ، کثیررکنی $x^2 - 3x - 4$ میں x کی جگہ 2 رکھنے سے جو ہمیں قدر 6 ملتی ہے وہ $x = 2$ پر $x^2 - 3x - 4$ کی قدر ہے۔ اسی طرح سے $p(x), p(0)$ کی قدر $x = 0$ پر قدر ہے جو 4 ہے۔

اگر $p(x)$ میں کوئی کثیررکنی ہے اور اگر K کوئی حقیقی عدد ہے تب $p(x)$ میں x کی جگہ k رکھنے سے جو قدر حاصل ہوتی ہے وہ $p(x)$ کی $x = k$ پر قدر ہوتی ہے۔ اور اس کو ہم $p(k)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$p(x) = x^2 - 3x - 4 \text{ کی } x = -1 \text{ پر قدر کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے:}$$

$$p(-1) = (-1)^2 - \{3 \times (-1)\} - 4 = 0$$

$$p(4) = 4^2 - (3 \times 4) - 4 = 0.$$

مزید نوٹ کیجئے

کیونکہ $p(-1) = 0$ اور $p(4) = 0$ اس لئے -1 اور 4 دو درجی کثیررکنی $x^2 - 3x - 4$ کے صفر کہلاتے ہیں۔
نویں کلاس میں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کسی خطی کثیررکنی کے صفر کیسے معلوم کئے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر K ،
 $P(x) = 2x + 3$ کا صفر ہے تب $p(k) = 0$ سے ہمیں ملتا ہے $2k + 3 = 0$ یعنی $k = -\frac{3}{2}$ مجموعی طور پر اگر $p(x) = ax + b$ کا صفر


$$\text{ہے تب } p(k) = ak + b = 0 \text{ یعنی } k = \frac{-b}{a}$$

$$\text{اس لئے خطی کثیررکنی } ax + b \text{ کا صفر ہے } \frac{-b}{a} \text{ (مستقل رکن)۔}$$

اس طرح خطی کثیررکنیوں کا صفر ان کے ضریب سے متعلق ہوتا ہے، کیا ایسا دوسری کثیررکنیوں کے ساتھ بھی ہے؟ مثال کے طور پر کیا دو درجی کثیررکنیوں کے صفر بھی ان کے ضریبوں سے متعلق ہیں؟
اس باب میں ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم کثیررکنیوں کے تقسیمی الگورتھم کا بھی مطالعہ کریں گے۔

2.2 کثیررکنی کے صفر کا جیومیٹریائی مفہوم

آپ جانتے ہیں کہ حقیقی عدد k کثیررکنی $p(x)$ کا صفر ہوتا ہے اگر $p(k) = 0$ ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثیررکنیوں کے



شکل: 2.1

صفر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کا جواب دینے کے لئے پہلے ہم خطی اور دو درجی کثیر رکنیوں کا جیومیٹریائی اظہار اور ان کے صفروں کا جیومیٹریائی مفہوم (مطلب) سمجھیں گے۔

پہلے آپ خطی کثیر رکنی $ax + b, a \neq 0$ پر غور کیجئے۔ آپ نوں کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ $y = ax + b$ کا گراف ایک خط مستقیم ہے۔ مثال کے طور پر $y = 2x + 3$ کا گراف ایک خط مستقیم ہے جو $(-2, -1)$ اور $(2, 7)$ نقطوں سے ہو کر گزرتا ہے۔

x	-2	2
$y = 2x + 3$	-1	7

شکل 2.1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $y = 2x + 3$ کا گراف $-x$ محور کو $x = -1$ اور $x = -2$ کے درمیان قطع کرتا ہے یعنی نقطہ $(-\frac{3}{2}, 0)$ پر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ $2x + 3$ کا صفر $-\frac{3}{2}$ ہے۔ اس طرح سے کثیر رکنی $2x + 3$ کا صفر اس نقطہ کے $-x$ محور کو قطع کرتا ہے۔


عمومی طور پر ایک خطی کثیر رکنی $ax + b, a \neq 0$ کے لئے $y = ax + b$ کا گراف ایک خط مستقیم ہے جو $-x$ محور کو صرف ایک نقطہ $(-\frac{b}{a}, 0)$ پر قطع کرتا ہے۔ اس لئے خطی کثیر رکنی $ax + b, a \neq 0$ کا صفر ایک صفر ہے اور اس نقطہ $-x$ مختص ہے جہاں $y = ax + b$ کا گراف $-x$ محور کو قطع کرتا ہے۔

آئیے اب ہم ایک دو درجی کثیر رکنی کے صفر کا جیومیٹریائی مفہوم (مطلب) پر غور کرتے ہیں دو درجی کثیر رکنی $x^2 - 3x - 4$ کا گراف کیسا نظر آتا ہے، آئیے کچھ قدروں کے لئے $y = x^2 - 3x - 4$ کی کچھ قدریں معلوم کرتے ہیں جیسا کہ جدول 2.1 میں دی گئی ہے۔

جدول 2.1

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 3x - 4$	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

* دو درجی اور سو درجی رکنیوں کی گراف سازی نہ تو طلباء سے کرائی جانی ہے اور نہ ہی جانچی جانی ہے



شکل: 2.2

اگر ہم مندرجہ بالا نقطوں کو گراف پر پلاٹ کر گراف بنائیں یہ بالکل ایسا ہی نظر آئے گا جیسا کہ شکل 2.2 میں دکھایا گیا ہے۔


درحقیقت کسی بھی دو درجی کثیررکنی $ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے لئے اس کی متعلقہ (نظیری) مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے گراف دو شکلوں میں ایک ہوگا یا تو اوپر کی طرف کھلا ہوا یا نیچے کی طرف کھلا ہوا اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا وہ $a > 0$ یا $a < 0$ (یہ منتخب مکانی (parabolas) کہلاتی ہیں۔

جدول 2.1 سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ -1 دو درجی کثیررکنی کے صفر ہیں۔ شکل 2.2 سے مزید نوٹ کیجئے کہ -1 اور 4 ان نقطوں کے x مختص ہیں جہاں $y = x^2 - 3x - 4$ کا گراف x محور کو قطع کرتا ہے۔ اس طرح سے دو درجی کثیر


رکنی $x^2 - 3x - 4$ کے صفران نقطوں کے x - مختصات ہیں جہاں $x^2 - 3x - 4$ کا گراف x - محور کو قطع کرتا ہے۔

یہ حقیقت کسی بھی دو درجی کثیررکنی کے لئے درست ہے یعنی دو درجی کثیررکنی $ax^2 - bx + c, a \neq 0$ کے صفران نقطوں کے x - مختصات ہیں جہاں $y = ax^2 + bx + c$ کو ظاہر کرنے والا مکانی (Parabola) x - محور کو قطع کرتا ہے۔ مندرجہ بالا $y = ax^2 + bx + c$ کے گراف کی شکل سے متعلق 3 حالتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

حالت (i) یہاں گراف x - محور کو دو مختلف نقاط A اور A' پر قطع کرتا ہے اور A اور A' کے x - مختصات دو درجی کثیررکنی $ax^2 + bx + c$ کے صفران حالت کے لئے شکل 2.3 دیکھئے۔




(i)




(ii)

شکل 2.3

حالت (ii) یہاں گراف x -محور کو صرف ایک نقطہ پر قطع کرتا ہے یعنی دو منطبق نقطوں پر اس لئے حالت (i) کے دو نقطے A اور A' یہاں منطبق ہو کر ایک نقطہ A بن جاتا ہے (شکل 2.4 دیکھئے)



(i)




(ii)

شکل 2.4

A کا $-x$ مختص دو درجہ کی کثیررکتی $ax^2 + bx - c$ کا واحد صفر ہے۔

حالت (iii): یہاں یا تو گراف پورا پورا x -محور کے اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف۔ اس لئے یہ x -محور کو کسی بھی نقطہ پر قطع نہیں کرے گا (شکل 2.5 دیکھئے)۔




شکل 2.5

اس لئے اس حالت میں دو درجی کثیررکنی $ax^2 + bx + c = 0$ کا کوئی اثر نہیں ہے۔
 تو جیومیٹریائی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو درجی کثیررکنی کے یا تو مختلف صفر یا دو مساوی صفر (یعنی ایک صفر) یا کوئی صفر نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو درجی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ دو صفر ہو سکتے ہیں۔
 اب آپ کبھی کثیررکنی کے جیومیٹریائی مفہوم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اسے معلوم کرتے ہیں، کبھی کثیررکنی $x^3 - 4x$ پر غور کیجئے۔ یہ جاننے کے لئے کہ $x^3 - 4x = 0$ کا گراف کیسا نظر آتا ہے x کے نظیری y کی کچھ قدروں فہرست تیار کیجئے جیسا کہ جدول 2.2 میں دکھایا گیا ہے۔

جدول 2.2


x	-2	-1	0	1	2
$y = x^3 - 4x$	0	3	0	-3	0

جدول میں دیے گئے نقطوں کو گراف پر پلاٹ کرنے اور گراف بنانے سے ہم دیکھتے ہیں $y = x^3 - 4x$ کا گراف دراصل شکل 2.6 کی طرح نظر آتا ہے۔




شکل 2.6

جدول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ $0, -2$ اور 2 کبھی کبھی کثیررکنی $x^3 - 4x$ کے صفر ہیں مشاہدہ کیجئے کہ $-2, 0$ اور 2 دراصل ان نقطوں کے x مختص ہیں جہاں $y = x^3 - 4x$ کا گراف x -محور کو قطع کرتا ہے۔ کیونکہ منحنی x -محور کو صرف ان تین نقطوں پر قطع کرتی ہے اس لئے ان کے x -مختصات کثیررکنی صفر ہیں۔ آئیے کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ کئی کثیررکنیوں x^3 اور x^2 پر غور کیجئے۔ ہم $y = x^3 - x^2$ اور $y = x^3 - x^2$ کا گراف بالترتیب شکل 2.7 اور شکل 2.8 میں دکھاتے ہیں۔



شکل 2.7




شکل 2.8

نوٹ کیجئے کہ 0 کثیررکنی x^3 کا واحد صفر ہے۔ مزید شکل 2.7 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واحد نقطے کا x - مختص ہے جہاں $y = x^3$ کا گراف x - محور کو قطع کرتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$ ، اور 0 اور 1 کثیررکنی $x^3 - x^2$ کے واحد صفر ہیں۔ مزید شکل 2.8 سے x - مختصات کی یہ قدریں وہ نقطے ہیں جہاں $y = x^3 - x^2$ کا گراف ہے۔ x محور کو قطع کرتا ہے۔

مذکورہ بالا مثالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کجی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ 3 صفر ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں درجہ 3 کی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ 3 صفر ہوتے ہیں۔

ریمارک: عمومی طور پر n درجہ کی ایک کثیررکنی $p(x)$ دی ہوتی ہے۔ $y = p(x)$ کا گراف n محور کو n نقطوں پر قطع کرے گا۔ اس لئے n درجہ والی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ 3 صفر ہوں گے۔

مثال 1: نیچے دئے گئے شکل 2.9 کے گراف کو دیکھئے۔ ہر ایک $y = p(x)$ کا گراف ہے جہاں $p(x)$ ایک کثیررکنی ہے۔ ہر ایک گراف کے لئے $p(x)$ کے صفر کی تعداد معلوم کیجئے۔




شکل 2.9

حل:

- (i) صفر کی تعداد 1 ہے کیونکہ گراف x -محور کو صرف ایک نقطہ پر قطع کرتا ہے۔
(ii) صفر کی تعداد 2 ہے کیونکہ گراف x -محور کو دو نقطوں پر قطع کرتا ہے۔
(iii) صفر کی تعداد 3 ہے (کیوں؟)
(iv) صفر کی تعداد 1 ہے (کیوں؟)
(v) صفر کی تعداد 1 ہے (کیوں؟)
(vi) صفر کی تعداد 4 ہے (کیوں؟)

مشق 2.1

1- نیچے شکل 2.10 میں کسی کثیر رکنی $y=p(x)$ کا گراف دیا ہوا ہے۔ ہر ایک کے لئے $p(x)$ کے صفر کی تعداد معلوم کیجئے۔



شکل 2.10

2.3 کثیررکنی کے صفر اور ضربیوں کے درمیان تعلق

آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ خطی کثیررکنی $ax + b$ کا صفر $-\frac{b}{a}$ ہے۔ اب ہم سیکشن 2.1 اٹھائے گئے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یعنی دو درجی کثیررکنی کے صفر اور ضربیوں کے درمیان تعلق کے بارے میں اس مقصد کے لیے ایک دو درجی مساوات $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ کو لیتے ہیں۔ نویں کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح دو درجی کثیررکنی کے وسطیٰ کو منقسم کر کے اس کے اجزائے ضربی بناتے ہیں۔ اس لئے یہاں ہمیں وسطیٰ رکن $-8x$ کو منقسم کرنا ہے دو ارکان کے حاصل جمع میں جن کا حاصل ضرب $6 \times 2x^2 = 12x^2$ ہے اس لئے ہم لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 6 &= 2x^2 - 6x - 2x + 6 = 2x(x-3) - 2(x-3) \\ &= (2x-2)(x-3) = 2(x-1)(x-3) \end{aligned}$$

اس لئے $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ کی قدر صفر ہے۔ جہاں $x-1=0$ یا $x-3=0$ یعنی جب $x=1$ یا $x=3$ اس

لئے $2x^2 - 8x + 6$ کے صفر 1 اور 3 ہیں مشاہدہ کیجئے کہ

$$\text{جمع کا ضرب } x = \frac{-(-8)}{2} = \frac{8}{2} = 4 = 1 + 3 = \text{صفروں کا حاصل جمع}$$

$$\text{مستقل رکن کا ضرب } x^2 = \frac{6}{2} = 3 = 1 \times 3 = \text{صفروں کا حاصل جمع}$$

آئیے ایک اور دو درجی کثیررکنی لیتے ہیں مان لیجئے $p(x) = 3x^2 + 5x - 2$ وسطیٰ رکن کو منقسم کرنے کے طریقہ سے ہمیں ملتا ہے

$$\begin{aligned} 3x^2 + 5x - 2 &= 3x^2 - 6x - x - 2 = 3x(x+2) - 1(x+2) \\ &= (3x-1)(x+2) \end{aligned}$$

اس طرح سے $3x^2 - 5x - 2$ کی قدر صفر ہے اگر یا تو $3x-1=0$ یا $x+2=0$ یعنی

$$x = -2 \text{ اس لئے } 3x^2 - 5x - 2 \text{ کے صفر } \frac{1}{3} \text{ اور } -2 \text{ ہیں}$$

مشاہدہ کیجئے کہ

$$\text{جمع کا ضرب } x = \frac{1}{3} - (-2) = \frac{-5}{3} = \frac{-5}{3} = \frac{-5}{3} = \text{صفروں کا حاصل جمع}$$

$$\text{مستقل رکن کا ضرب } x^2 = \frac{1}{3} \times (-2) = \frac{-2}{3} = \frac{-2}{3} = \text{صفروں کا حاصل ضرب}$$

عمومی طور پر، اگر α^* ، β^* کثیررکنی $p(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے صفر ہیں تب آپ یہ جانتے ہیں کہ

$x - \alpha$ اور $x - \beta$ کے اجزائے ضربی ہیں اسلئے

$$ax^2 + bx + c = k(x - \alpha)(x - \beta) \text{ (جہاں } k \text{ ایک مستقلہ ہے)}$$

$$= k [x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$$

$$= kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta$$

اور منقلہ کے ضریبوں کا دونوں طرف موازنہ کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\alpha = k, b = -k(\alpha + \beta) \text{ اور } c = k\alpha\beta$$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} \text{ اس سے حاصل ہوتا ہے}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ اور}$$

$$\text{یعنی } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-(x \text{ کا ضریب})}{x^2 \text{ کا ضریب}}$$

$$\text{مستقلہ رکن } \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{مستقلہ رکن}}{x^2 \text{ کا ضریب}}$$

آئیے کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں۔

مثال 2: دو درجی کثیررکنی $x^2 + 7x + 10$ کے صفر معلوم کیجئے اور صفر اور ضریبوں کے درمیان تعلق کی تصدیق کیجئے۔

حل: ہمارے پاس ہے

$$x^2 - 7x - 10 = (x + 2)(x + 5)$$

اس لئے $x^2 + 7x + 10$ کی قدر 0 ہوگی جب $x + 2 = 0$ یا $x + 5 = 0$ یعنی جب $x = -2$ یا $x = -5$ اس لئے

$$x^2 + 7x + 10 \text{ کے صفر } -2 \text{ اور } -5 \text{ ہیں۔ اب}$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-(-7)}{1} = 7 \text{ (} x \text{ کا ضریب)}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{10}{1} = 10 \text{ (مستقلہ رکن)}$$

α^* ، β^* یونان زبان کے الفاظ بالترتیب 'الفا' اور 'بیٹا' کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آگے ایک اور لفظ 'گاما' آگے جسے گاما کے نام سے جانا جاتا ہے۔

مثال 3: کثیررکنی $x^2 - 3$ کے صفر معلوم کیجئے اور اس کے صفر اور ضربیوں کے درمیان تعلق کی تصدیق کیجئے۔

حل: تماثل $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ اس کے استعمال کرنے پر ہم لکھ سکتے ہیں

$$x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

اس لئے $x^2 - 3$ کی قدر صفر ہے اگر $x = \sqrt{3}$ یا $x = -\sqrt{3}$

اس لئے $x^2 - 3$ کے صفر $\sqrt{3}$ اور $-\sqrt{3}$ ہیں

اب

$$\text{جمع کا صفر} = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0 = \frac{-(x \text{ کا ضربی})}{x^2 \text{ کا ضربی}}$$

$$\text{مستقل رکن} = (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -3 = \frac{-3}{1} = \frac{-3}{x^2 \text{ کا ضربی}}$$

مثال 4: دودرجی کثیررکنی معلوم کیجئے اگر اس کے صفر کا حاصل جمع اور حاصل ضرب بالترتیب 3 اور 2 ہے

حل: مان لیجئے دودرجی کثیررکنی $ax^2 + bx + c$ ہے اور اس کے صفر α اور β ہیں،

ہمارے پاس ہے

$$\alpha + \beta = -3 = \frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta = 2 = \frac{c}{a} \quad \text{اور}$$

$$\text{اگر } a = 1 \text{ تب } b = 3 \text{ اور } c = 2$$

اس لئے ایسی دودرجی کثیررکنی جو ان شرطوں کو پوری کرتی ہے وہ $x^2 + 3x + 2$ ہے

آپ جانچ کر سکتے ہیں کوئی دوسری دودرجی کثیررکنی جو ان شرطوں کو پورا کر سکتی ہے وہ $k(x^2 - 3x + 2)$ کی شکل کی

ہوگی جہاں k حقیقی عدد ہے۔

آئیے اب کبھی کثیررکنیوں پر غور کرتے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کبھی کثیررکنیوں کے صفر اور ضربیوں کے درمیان یہی

تعلق درست ہے؟

آئیے $p(x) = 2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ پر غور کیجئے۔

آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ $x = 4, -2, \frac{1}{2}$ کے لئے $p(x) = 0$ کیونکہ $p(x)$ کے زیادہ سے زیادہ تین صفر ہو سکتے ہیں،

اس لئے یہ $2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ کے صفر ہیں۔ اب

$$\frac{x \text{ کا ضرب } (-)}{x^3 \text{ کا ضرب } (-)} = 4 + (-2) - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{-(-5)}{2} = \frac{-(-5)}{2}$$

$$\frac{\text{مستقل رکن}}{x^3 \text{ کا ضرب } (-)} = 4 \times (-2) \times \frac{1}{2} = -4 = \frac{8}{2} = \frac{-(-8)}{2}$$

لیکن یہاں ایک اور تعلق نظر آتا ہے۔ دو صفروں کو ایک ساتھ لے کر ان کے حاصل ضربوں کا حاصل جمع پر غور کیجئے۔

$$\begin{aligned} & \{4 \times (-2)\} + \left\{(-2) \times \frac{1}{2}\right\} + \left\{\frac{1}{2} \times 4\right\} \\ & = -8 - 1 + 2 = -7 = \frac{-14}{2} = \frac{-(-14)}{2} = \frac{-(-14)}{2} \end{aligned}$$

عمومی طور پر یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اگر α, β, γ کبھی کبھی $ax^3 + bx^2 + cx + d$ کے صفر ہیں

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a}, \quad \text{تو}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}$$

آئیے کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں

مثال 5: تصدیق کیجئے کہ $3, -1$ اور $-\frac{1}{3}$ کبھی کبھی $p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ کے صفر ہیں اور پھر صفروں

اور اس کے ضربوں کے درمیان تعلق کی تصدیق کیجئے۔

حل: دی ہوئی کبھی کبھی $ax^3 + bx^2 + cx + d$ سے موازنہ کیجئے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$a = 3, b = -5, c = -11, d = -3.$$

$$p(3) = 3 \times 3^3 - (5 \times 3^2) - (11 \times 3) - 3 = 81 - 45 - 33 - 3 = 0, \quad \text{مزید}$$

$$p(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 - 11 \times (-1) - 3 = -3 - 5 + 11 - 3 = 0,$$

* امتحان کے نقطہ نظر سے نہیں۔

$$\begin{aligned} p\left(-\frac{1}{3}\right) &= 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 5 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 11 \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 3 \\ &= -\frac{1}{9} - \frac{5}{9} + \frac{11}{3} - 3 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - 0 \end{aligned}$$

اس لئے 1, 3 اور $-\frac{1}{3}$ کثیررکنی $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ کے صفر ہیں۔

اس لئے ہم $\alpha = 3$, $\beta = -1$ اور $\gamma = -\frac{1}{3}$ لیتے ہیں

$$\alpha + \beta + \gamma - 3 + (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) - 2 - \frac{1}{3} - \frac{5}{3} - \frac{-(-5)}{3} - \frac{-b}{a}, \quad \text{اب}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha - 3 \times (-1) + (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) \times 3 - -3 + \frac{1}{3} - 1 - \frac{-11}{3} - \frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = 3 \times (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 = \frac{(-3)}{3} = \frac{d}{a}$$

مشق 2.2

1- مندرجہ ذیل کثیررکنیوں کے صفر معلوم کیجئے اور ان کے صفر اور ضربوں کے درمیان تعلق کی تصدیق کیجئے۔

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| (i) $x^2 - 2x - 8$ | (ii) $4x^2 - 4x + 1$ | (iii) $6x^3 - 3 - 7x$ |
| (iv) $4u^2 + 18u$ | (v) $t^2 - 15$ | (vi) $3x^2 - x - 4$ |

2- دو درجہ کثیررکنی معلوم کیجئے جن کے صفروں کے حاصل جمع اور حاصل ضرب بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| (i) $\frac{1}{4} - 1$ | (ii) $1\sqrt{2}, \frac{1}{3}$ | (iii) $0, \sqrt{5}$ |
| (iv) 1, 1 | (v) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ | (vi) 4, 1 |

2.4 کثیررکنیوں کا تقسیمی الگورتھم

آپ جانتے ہیں کہ کبھی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ تین صفر ہیں۔ لیکن اگر آپ کو صرف ایک صفر دیا ہوا ہو تو کیا آپ دوسرے دو صفر معلوم کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے کے لئے آئیے کبھی کثیررکنی $x^3 - 3x^2 - x + 3$ پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا ایک صفر 1 ہے تب آپ یہ جانتے ہیں کہ $(x-1)$ ، $x^3 - 3x^2 - x + 3$ کا جزو ضربی ہوگا۔ اس لئے آپ

$x^3 - 3x^2 - x + 3$ کو $x-1$ سے تقسیم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نوں کلاس میں سیکھ چکے ہیں، ایسا کرنے سے آپ کو خارج قسمت $x^2 - 2x - 3$ کے وسطیٰ رکن کو منقسم کر کے دوسرے اجزائے ضربی $(x+1)(x-3)$ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ملے گا۔

$$\begin{aligned} x^3 - 3x^2 - x + 3 &= (x-1)(x^2 - 2x - 3) \\ &= (x-1)(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

اس طرح اب آپ کو کئی کثیر رکنی کے تینوں صفر معلوم ہیں جو ہیں، 1، -1، 3

آئیے تفصیل سے ہم ایک کثیر رکنی کو دوسری کثیر رکنی سے تقسیم کرنے کے طریقہ پر غور کرتے ہیں۔ اقدام کورسی طور پر نوٹ کرنے سے پہلے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔

مثال 6: $2x^2 - 3x + 1$ کو $x + 2$ سے تقسیم کیجئے۔

$$\begin{array}{r} 2x \quad 1 \\ x+2 \overline{) 2x^2 + 3x \quad 1} \\ \underline{2x^2 + 4x} \\ -x + 1 \\ \underline{-x - 2} \\ 3 \end{array}$$

حل: آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم تقسیم کے عمل کو روک دیتے ہیں اگر یا تو باقی صفر ہو جائے یا اس کا درجہ قاسم کے درجہ سے کم ہو جائے۔ اس لئے یہاں خارج قسمت $(2x-1)$ اور باقی 3 ہے مزید۔

$$(2x-1)(x+2) + 3 = 2x^2 + 3x - 2 + 3 = 2x^2 + 3x + 1$$

$$2x^2 + 3x + 1 = (x+2)(2x-1) + 3 \text{ یعنی}$$

اس لئے مقسوم = قاسم \times خارج قسمت + باقی

اس لئے اس عمل کی توسیع ہم ایک کثیر رکنی کو دوسری کثیر رکنی سے تقسیم کرنے کے لئے کرتے ہیں۔

مثال 7: $3x^3 + x^2 + 2x + 5$ کو $1 + 2x + x^2$ سے تقسیم کیجئے۔

$$\begin{array}{r} 3x - 5 \\ x^2 - 2x + 1 \overline{) 3x^3 + x^2 + 2x + 5} \\ \underline{3x^3 + 6x^2 + 3x} \\ -5x^2 - x + 5 \\ \underline{-5x^2 - 10x - 5} \\ 9x + 10 \end{array}$$

حل: سب سے پہلے ہم مقسوم اور قاسم کے ارکان کو درجہ کے حساب سے

گھٹتی ہوئی ترتیب میں رکھتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ اس طرح کثیر رکنی کے

ارکان کو ترتیب میں رکھنے کا مطلب کثیر رکنی کو معیاری شکل میں لکھنا ہے۔

اس مثال میں مقسوم پہلے ہی معیاری شکل میں لکھا ہوا ہے اور قاسم کی

معیاری شکل $x^2 + 2x + 1$ ۔

قدم 1: خارج قسمت کا پہلا رکن حاصل کرنے کے لئے مقسوم کی اعظم درجہ کے رکن (یعنی $3x^3$) کو قاسم کے اعظم درجہ کے رکن (یعنی x^2) سے تقسیم کیجئے۔ یہ $3x$ ہے پر تقسیم کا عمل کیجئے۔
جو باقی بچتا ہے وہ ہے $5x^2 - x + 5$ ۔

قدم 2: اب خارج قسمت کے دوسرے رکن کو حاصل کرنے کے لئے نئے مقسوم کے اعظم درجہ کے رکن (یعنی $5x^2$) کو قاسم کے اعظم درجہ کے رکن (یعنی x^2) سے تقسیم کیجئے۔ اس سے 5 ملتا ہے دوبارہ تقسیم کے عمل کو $5x^2 - x + 5$ پر دہرائیئے۔

قدم 3: جو باقی بچتا ہے وہ $9x + 10$ ہے اب $9x + 10$ کا درجہ قاسم $x^2 + 2x + 1$ کے درجہ سے کم ہے۔ اس لئے تقسیم کا عمل آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔

اس لئے اب خارج قسمت $(3x - 5)$ ہے اور باقی $9x + 10$ مزید

$$(x^2 + 2x + 1) \times (3x - 5) + (9x + 10) = 3x^3 + 6x^2 - 3x - 5x^2 - 10x - 5 + 9x + 10$$

$$= 3x^3 + x^2 + 2x + 5$$

یہاں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ

مقسوم = قاسم \times خارج قسمت + باقی

یہاں جو تصور ہم استعمال کر رہے ہیں وہ الگورتھم ہے جو اقلیدس کے تقسیم کے الگورتھم کے مشابہ ہے جس کو آپ نے باب 1

میں پڑھا ہے۔

اس کے مطابق

اگر $p(x)$ اور $g(x)$ دو کثیر رکنیاں ہیں جہاں $g(x) \neq 0$ تب ہم کثیر رکنیاں $q(x)$ اور $r(x)$ معلوم کر سکتے ہیں جبکہ

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x)$$

جہاں $r(x) = 0$ یا $g(x)$ کا درجہ $r(x) < g(x)$ کا درجہ

یہ نتیجہ کثیر رکنیوں کا تقسیمی الگورتھم کہلاتا ہے۔

اس کے استعمال کو واضح کرنے کے لئے آئیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔
مثال 8: $3x^2 - x^3 - 3x + 5$ کو $x^2 + x - 1$ سے تقسیم کیجئے اور تقسیمی اگورتھم کی تصدیق کیجئے۔

$$\begin{array}{r} x-2 \\ -x^2+x-1 \overline{) x^3+3x^2-3x+5} \\ \underline{x^3+x^2-x} \\ 2x^2+2x+5 \\ \underline{2x^2+2x+2} \\ 3 \end{array}$$

حل: نوٹ کیجئے کہ دی ہوئی کثیررکنیاں معیاری شکل میں نہیں ہیں تقسیم کرنے کے لئے پہلے ان کو یعنی مقسوم اور قاسم کو معیاری شکل میں لکھئے۔ یعنی ان کے درجوں کے حساب سے گھٹتی ہوئی ترتیب میں تقسیم کا عمل بائیں طرف دکھایا گیا ہے۔

ہم یہیں رک جاتے ہیں کیونکہ (3) کا درجہ 0 ہے جو 2 سے چھوٹا ہے $-x^2 + x - 1$ کے درجہ سے۔ اس لئے خارج قسمت $x - 2$ باقی $3 =$ ہے۔

اب

قاسم \times خارج قسمت + باقی

$$\begin{aligned} &= (-x^2 + x - 1)(x - 2) - 3 \\ &= x^3 + x^2 - x + 2x^2 - 2x + 2 - 3 \\ &= -x^3 + 3x^2 - 3x + 5 \\ &= \text{مقسوم} \end{aligned}$$

اس طرح سے تقسیمی اگورتھم کی تصدیق ہوگئی۔

مثال 9: $2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ کے تمام صفر معلوم کیجئے اگر آپ جانتے ہوں کہ اس کے دو صفر $\sqrt{2}$ اور $-\sqrt{2}$ ہیں

حل: کیونکہ دو صفر $\sqrt{2}$ اور $-\sqrt{2}$ ہیں۔ $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = x^2 - 2$ دی ہوئی کثیررکنی کا ایک جزو ضربی ہے اب ہم دی ہوئی کثیررکنی کو $x^2 - 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 3x + 1 \\ x^2 \overline{) 2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2} \\ \underline{2x^4} \\ -3x^3 - 3x^2 + 6x - 2 \\ \underline{-3x^3} \\ 0x^3 + 0x^2 + 6x - 2 \\ \underline{0x^3} + 6x - 2 \\ \underline{6x} \\ -2 \\ \underline{-2} \\ 0 \end{array}$$

$$\frac{2x^4}{x^2} = 2x^2 \text{ ہے خارج قسمت کا پہلا رکن}$$

$$\frac{-3x^3}{x^2} = -3x \text{ ہے خارج قسمت کا دوسرا رکن}$$

$$\frac{x^2}{x^2} = 1 \text{ ہے خارج قسمت کا تیسرا رکن}$$

$$2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2 = (x^2 - 2)(2x^2 - 3x + 1) \text{ اس لئے}$$

اب $3x - 1$ کو منقسم کرنے پر ہم $2x^2 - 3x + 1$ کے اجزائے ضربی $(2x-1)(x-1)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس لئے اس

$$\text{کے صفر ہیں } x = \frac{1}{2} \text{ اور } x = 1 \text{ اس لئے دی ہوئی کثیررکنی کے صفر ہیں } \frac{1}{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, \text{ اور } -1$$

مشق 2.3

1- کثیررکنی $p(x)$ کو کثیررکنی $g(x)$ سے تقسیم کیجئے اور مندرجہ ذیل میں ہر ایک کا خارج قسمت اور باقی معلوم کیجئے۔

(i) $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ $g(x) = x^2 - 2$

(ii) $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5$ $g(x) = x^2 + 1 - x$

(iii) $p(x) = x^4 - 5x + 6$ $g(x) = 2 - x^2$

2- دوسری کثیررکنی کو پہلی کثیررکنی سے تقسیم کر کے جانچ کیجئے کہ آیا پہلی کثیررکنی دوسری کثیررکنی کا جزو ضربی ہے۔

(i) $t^2 - 3, 2t^4 - 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12$

(ii) $x^2 + 3x + 1, 3x^4 - 5x^3 - 7x^2 - 2x + 2$

(iii) $x^3 - 3x + 1, x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1$

3- اگر $3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$ کے دو صفر $\sqrt{\frac{5}{3}}$ اور $-\sqrt{\frac{5}{3}}$ ہیں تو باقی صفر معلوم کیجئے۔

4- $3x^2 + 1$ کو کثیررکنی $g(x)$ سے تقسیم کرنے پر خارج قسمت اور باقی بالترتیب $(x-2)$ اور $-2x+4$

ہیں۔ $g(x)$ معلوم کیجئے۔

5- کثیررکنیاں $p(x), g(x), q(x)$ اور $r(x)$ کی مثالیں دیجئے جو تقسیمی الگورتھم کو مطمئن کریں اور

(i) $p(x)$ کا درجہ = $q(x)$ کا درجہ (ii) $r(x)$ کا درجہ = $q(x)$ کا درجہ (iii) $r(x)$ کا درجہ = 0

مشق 2.4 (اختیاری)*

1- تصدیق کیجئے کہ مندرجہ کعبی کثیررکنیوں کے ساتھ دئے گئے اعداد ان کے صفر ہیں۔ ہر ایک کے لئے صفر اور ضربوں کے درمیان تعلق کی تصدیق بھی کیجئے۔

(i) $2x^3 + x^2 - 5x + 2; \frac{1}{2}, 1, -2$

(ii) $x^3 - 4x^2 + 5x - 2; 1, 1$

2- ایک کعبی کثیررکنی معلوم کیجئے جن کے صفروں کا حاصل جمع اور دو صفر ایک ساتھ لینے پر حاصل ضربوں کا حاصل جمع اور صفر کا حاصل ضرب بالترتیب 2, -7, -14 ہے۔

3- اگر کثیررکنی $x^3 - 3x^2 + x + 1$ کے صفر $a, a+b$ اور a ہیں تو b اور a معلوم کیجئے۔

4- اگر کثیررکنی $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10$ کے دو صفر $2 = \sqrt{3}$ ہیں تو دوسرے صفر معلوم کیجئے۔

5- اگر کثیررکنی $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10$ کو ایک دوسری کثیررکنی سے $x^2 - 2x - k$ سے تقسیم کیا جاتا ہے تو باقی $x + a$ آتا ہے k اور a کی قدر معلوم کیجئے۔

2.5 خلاصہ

اس باب میں آپ نے مندرجہ ذیل باتیں (نقطے) سیکھیں

- 1- درجہ 1, 2 اور 3 کی کثیررکنیاں بالترتیب خطی، دو درجی اور کعبی کثیررکنیاں کہلاتی ہیں۔
- 2- x میں حقیقی اعداد کے ضربوں کے ساتھ کثیررکنی $ax^2 + bx - c$ کی شکل کی ہوتی ہے۔ جہاں a, b, c حقیقی اعداد ہیں جس میں $a \neq 0$

3- کثیررکنی $p(x)$ کے صفران نقطوں کے $-x$ مختصات ہیں جہاں $y = p(x)$ کا گراف $-x$ محور کو قطع کرتا ہے۔

4- ایک دو درجی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ 2 اور کعبی کثیررکنی کے زیادہ سے زیادہ 3 صفر ہوتے ہیں۔

5- اگر α, β دو درجی کثیررکنی $ax^2 + bx - c$ کے صفر ہیں تب

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

6- اگر α, β, γ کعبی کثیررکنی $ax^3 + bx^2 + cx + d$ کے صفر ہیں تب

$$\alpha + \beta \gamma = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha \beta + \beta \gamma + \gamma \alpha = \frac{c}{a}$$

$$\alpha \beta \gamma = \frac{-d}{a}$$

7- تقسیمی الگورتھم کے مطابق دی ہوئی کوئی کثیر رکنی $p(x)$ اور ایک غیر صفر کثیر رکنی $g(x)$ کے لئے کثیر رکنیاں

$q(x)$ اور $r(x)$ اس طرح ہیں کہ۔

$$p(x) = g(x) q(x) + r(x)$$

جہاں $r(x) = 0$ یا $g(x)$ کا درجہ $< r(x)$ کا درجہ۔

© NCERT
not to be republished